

Abeille domestique



Guêpe



Frelon européen



Frelon asiatique



Le frelon asiatique est noir et orange. Il est également très dangereux à proximité de son nid tout comme les autres hyménoptères.



Le 1^{er} nid, dit primaire, est de la taille d'un pamplemousse logé à ~2 m du sol avant la conception du nid principal qui est de la taille d'un ballon de basket et pouvant aller jusqu'à 1 m de circonférence.

La participation à leur piégeage par le plus grand nombre est gage d'une diminution importante des nids cet été. De ce fait, moins de piqûres, nos terrasses et nos fruits en sécurité et moins d'interventions des sapeurs- pompiers. Ainsi, cela nous permet de diminuer les insecticides puissants dans nos jardins et nos bois et permet également la diminution de dépense financière dans nos collectivités.

🇫🇷 Calendrier pour les mois qui arrivent !

Mars : Début du piégeage (jusqu'à début juin)

Juin : Repérage des nids primaires (petites tailles)

Juillet : Début des nids principaux (cimes des arbres, haies, bâtiments)

Les sapeurs-pompiers détruisent les nids gratuitement après la confirmation d'un référent frelons asiatiques


Liste des diagnostiqueurs frelons de l'Aisne 

Piège du commerce (~3€)



- 5cl de sirop de cassis, fraise, framboise...
- 5cl de vin blanc (répulsif à abeilles)
- 5cl de bière brune (optionnel)
- Imbibez une éponge ou tissu
- Ajoutez une pierre ou deux pour contrer le vent

Les pièges doivent être rechargés en liquide régulièrement pour + d'efficacité.



**Aidez-nous à sauver les
abeilles !**

Contactez-moi
pour toutes questions :
monchaux.frederic@orange.fr

Amis des abeilles, de l'environnement et de votre portefeuille

Les frelons asiatiques seront
bientôt de retour !

Leurs reines vont sortir
d'hibernation courant mars.

Chaque reine piégée de
mars à début juin
représente un nid de
~ 2 000 frelons en moins
dans notre village dès juillet.

